Instructions for Use: Daily disposable contact lens – midafilcon A (56% water)/hioxifilcon A (47% water)

Important

- **Read the following instructions carefully before use and keep this document in a safe place for future reference.**
- **Always follow the instructions in this document and those of your eye care professional or practitioner for appropriate use of contact lenses.**

INTRODUCTION

- midafilcon A (56% water) is a blue tinted soft silicone hydrogel contact lens for daily disposable use.
- The lens material midafilcon A (56 % water) is individually packed in a foil-sealed plastic container and immersed in buffered saline solution. Non-55% and Toric versions: The lens material hioxifilcon A (47 % water) is individually packed in a foil-sealed plastic container and immersed in buffered saline solution.

INDICATIONS

- midafilcon A (56% water) is intended for single use daily wear only and correction of refractive ametropia (myopia, hyperopia and astigmatism) and presbyopia (accordance delaffectionate) in aphakic diseases free eyes.
- hioxifilcon A (57% water) is intended for single use daily wear only and correction of refractive ametropia (myopia, hyperopia and astigmatism) and presbyopia (excluding astigmatism) in non-aphakic disease-free eyes.

WARNING SIGNS AND SYMPTOMS

Remove and discard the contact lenses at the end of each day and replace with fresh lenses. Remove the lenses if the single-use contact lenses increase the risk of eye problems.

CONTRA-INDICATIONS

Do not wear the lenses if you have any of the following conditions.

- Acute and subacute inflammation or infection of the anterior chamber of the eyes
- Any trauma, injury, or abnormality that affects the cornea, the conjunctiva or eyelids
- Severe lacrimal secretion insufficiency (dry eyes)
- Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity)
- Any systemic disease that may adversely affect the eyes by wearing contact lenses
- Allergic reactions that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses
- Active corneal infection
- Red or irritated eyes
- Incomplete corneal healing following eye surgery

WARNINGS

Be aware of the following warnings pertaining to contact lens wear.

- Eye problems can develop rapidly and result in loss of vision. If corneal ulcers, can develop rapidly and lead to loss of vision. If corneal ulcers, pain, redness, eye irritation, blurred vision, or vision changes, visible on the eyes or other problems, immediately remove the lenses and consult your eye care professional or practitioner.

PRECAUTIONS

- Handle the contact lenses with care (be careful not to drop them).
- Wash, rinse and disinfect the lenses before each use.
- Put in the contact lenses before applying cosmetics. Remove cosmetics, lotions, creams, or sprays while handling the contact lenses.
- Consult your eye care professional or practitioner before using any product in your eyes.
- If the contact lens is dry or uncomfortable, apply a few drops of the lubricating or rewetting solution (recommended by your eye care professional or practitioner). Do not use saliva or eye drops to wet the lenses or rinse the lenses as they may lead to eye irritation or the discomfort still continues, immediately consult your eye care professional or practitioner.
- Avoid all harmful or irritating vapours and fumes while wearing the contact lenses.
- If any chemicals are splashed into the eyes, immediately flush the eyes with tap water, remove the contact lenses, and consult your eye care professional or practitioner, or visit a hospital emergency room. Consult your eye care professional or practitioner for instructions on how to remove the contact lenses and how to care for them in this specific circumstance.
- For multifocal contact lenses, it is recommended that you wear the lenses for short periods of time at first to allow your eyes to accustom to the lenses. Avoid activities (such as driving) and doing critical work while during adaptation period.
- Abrupt light changing the multifocal contact lenses may cause reduced vision acuity. Consult your eye care professional or practitioner if you feel uncomfortable with wearing the lenses in the right light.
- No cleaning or disinfecting is necessary for the daily disposable contact lenses. Do not reuse the lenses, as cleaning and disinfecting lenses or spectacles leading to you need to remove the lenses and wear a new pair.
- Do not wear the lenses beyond the recommended time.
- Follow-up visits are necessary to assure the continued health of your eyes.
- Consult your eye care professional or practitioner if you want to change the lens type or parameters.
- Inform your eyecare practitioner that you wear contact lenses.
- Store the contact lenses at room temperature. Do not allow the lenses to dry out.
- Do not share the lenses with others.

ADVERSE REACTIONS

If any of the following problems occur, immediately remove the contact lenses and replace with fresh lenses. If the problem still continues, consult your eye care professional or practitioner. Adverse reactions may result such as infection, corneal ulcer, neovascularization, and visits.

- Eye stinging, burning, itching, or any other pain in the eyes
- Continuously tearing or red or irritating sensation
- Excessive tearing, unusual eye secretions, redness, reduced visual acuity, blurred vision, halos around objects, or eye pain

If any serious incidents occur, immediately report it to the authorized representative and/or the manufacturer, and the competent authority.

HANDLING THE CONTACT LENSES

- Always wash, rinse, and dry your hands thoroughly before handling the contact lenses.
- Do not wear the contact lenses if the sterile packages have been opened or damaged, or if the expiration date has been passed.
- Always handle the left and right contact lenses in the same sequence (e.g. right lens first).
- For the flat packing:
- Do not apply excessive force to the flat packs for an extended period of time.
- Pick up the contact lens on the disc promptly after the flat pack is opened.

Opening the foil-sealed plastic container:

1. Hold the container as shown in the illustration and detach one container from the container unit.
2. Remove the container lid to open the package. (See Fig.2.)
3. Find one contact lens with the convex side facing up in the container.
4. Carefully pick up the lens from the container and examine it to be sure that it is free of any damage or foreign bodies. (See Fig.1.)

Öffnen der flachen Packung:

1. Ziehen Sie die Folie von der flachen Packung ab.
2. Die Kontaktlinse liegt mit der Außenseite nach oben in der flachen Packung.
3. Überprüfen Sie die Kontaktlinse auf Beschädigungen und Fremdkörper.
4. Nehmen Sie die Kontaktlinse mit der Innenseite nach oben auf die Spitze des Zeigefingers Ihrer dominanten Hand.

Aufsetzen der Kontaktlinsen:

1. Überprüfen Sie die Kontaktlinsen auf Beschädigungen und Fremdkörper.
2. Die Kontaktlinsen müssen immer in der richtigen Ausrichtung aufgesetzt werden. Überprüfen Sie die Kontaktlinsen auf Beschädigungen und Fremdkörper.
3. Nehmen Sie die Kontaktlinse mit der Innenseite nach oben auf die Spitze des Zeigefingers Ihrer dominanten Hand.
4. Halten Sie die Linse mit dem Zeigefinger Ihrer nicht dominanten Hand das Oberlid nach oben und ziehen Sie mit dem Mittelfinger Ihrer dominanten Hand das Unterlid nach unten.
5. Nähern Sie die Kontaktlinse langsam dem Auge, blicken Sie dabei geradeaus und setzen Sie die Linse vorsichtig auf.
6. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Linse.

Entfernen der Kontaktlinsen:

1. Waschen Sie sich die Hände und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Handtuch ab.
2. Halten Sie die Linse sanft zwischen Daumen und Zeigefinger Ihrer dominanten Hand fest.
3. Nehmen Sie die Linse vom Auge.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Linse.

Hersteller: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

Bevollmächtigter: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 5, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Autorisierter Repräsentant: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 5, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

CH-REP: Menicon Swiss GmbH Donnacherstrasse 27, 4500 Olten, Switzerland

Ausgabedatum 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd

Gebrauchsanweisung: Tageskontaktlinsen – midafilcon A (56 % Wasser)/hioxifilcon A (47 % Wasser)

Wichtig

- **Lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.**
- **Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Dokument und die Ihres Augenarztes/Optikers/Kontaktlinsenspezialisten für eine sachgemäße Verwendung von Kontaktlinsen.**

EINLEITUNG

midafilcon A (56 % Wasser) Tageslinse ist eine blau getönte weiche Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse mit einem Wassergehalt von 56 %.

Das Linsenmaterial midafilcon A (56 % Wasser) ist einzeln in einem mit geprägtem Aluminiumfolie versiegelten Kunststoffbehälter verpackt und in gepufferter Kochsalzlösung eingelegt.

Die hioxifilcon A (57 % Wasser) ist eine farblose weiche Hydrogelkontaktlinse mit einem Wassergehalt von 57 %.

Jede hioxifilcon A (57 % Wasser) Kontaktlinse ist steril in einer mit geprägter Aluminiumfolie versiegelten Kunststoffbehälter verpackt und in gepufferter Kochsalzlösung eingelegt.

ANWENDUNGSGEBIETE

- midafilcon A (56 % Wasser) ist bestimmt für einmaliges Tagestragen zur Korrektur der refraktiven Ametropie (Myopie, Hyperopie und Astigmatismus) und Presbyopie (außer Anfangsstufe) bei nicht-aphaken, gesunden Augen vorgesehen.
- hioxifilcon A (57 % Wasser) ist bestimmt für einmaliges Tagestragen zur Korrektur der refraktiven Ametropie (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und/oder Astigmatismus) und Presbyopie (ausgenommen Astigmatismus) bei nicht-aphaken, gesunden Augen vorgesehen.

EINSCHRÄNKUNGEN/WARNHINWEISE/RISIKEN

Entfernen und entsorgen Sie die Kontaktlinsen am Ende jedes Tages und ersetzen Sie sie durch neue Kontaktlinsen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, wenn bei Einmal-Kontaktlinsen für Sie ein zunehmender Gebrauch einhin das Risiko von Augenbeschwerden.

GEGENANZEIGEN

Tragen Sie die Kontaktlinsen nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt.

- Akute und subakute Entzündung oder Infektion der vorderen Augenkammer
- Verletzungen, Entzündungen oder Anomalien mit Auswirkung auf die Hornhaut, Bindehaut oder Augenlider
- Ausgeprägte trockene Augen
- Hornhaut-Hypoästhesie (verminderte Hornhautsensibilität)
- Systemische Erkrankungen, die sich auf die Augen auf Kontaktlinsen nachteilig auf die Augen auswirken können
- Allergische Reaktionen, die durch das Tragen von Kontaktlinsen hervorgerufen oder verschlimmert werden können
- Bestehende Hornhautinfektionen
- Gerötete oder gereizte Augen
- Unvollständig ausgeheilte Hornhaut nach Augenoperationen

WARNHINWEISE

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise zum Tragen von Kontaktlinsen.

- Durch das Tragen von Kontaktlinsen hervorgerufene Augenprobleme, wie zum Beispiel Hornhautgeschwüre, können sich schnell entwickeln und zu einem Verlust der Sehfähigkeit führen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen sofort und suchen Sie unverzüglich Ihren Augenarzt/Optiker/Kontaktlinsenspezialisten auf, wenn Sie Hornhautgeschwüre, Augenschmerzen, gerötete Augen oder andere Probleme an den Augen bemerken.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Handhaben Sie die Kontaktlinsen sorgfältig (lassen Sie sie nicht fallen).
- Reinigen Sie die Kontaktlinsen vor dem Tragen.
- Setzen Sie die Kontaktlinsen vor dem Auftragen von Kosmetika auf. Benutzen Sie keine kosmetischen Produkte wie Lotionen, Cremes, Sprays, Parfüm oder Haarspray, während Sie Kontaktlinsen tragen.
- Sprechen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten, bevor Sie Medikamente für Ihre Augen anwenden.
- Falls sich die Kontaktlinsen auf Ihren Augen trocken anfühlen, geben Sie einige Tropfen Befeuchtungslösung direkt auf das Auge und warten bis sie die Kontaktlinsen sich befeuchtet haben. Verwenden Sie keinen Speichel oder Augentropfen, um die Linsen zu befeuchten. Kontaktlinsenreinigungslösungen können Augenreizungen verursachen.
- Vermeiden Sie schädlichen oder reizenden Dampf und Rauch während Sie die Kontaktlinsen tragen.
- Falls Chemikalienspritzer in Ihre Augen gelangen, spülen Sie die Augen sofort mit Leitungswasser, entfernen Sie die Kontaktlinsen und suchen Sie sofort Ihren Augenarzt/Optiker/Kontaktlinsenspezialisten oder eine Notaufnahme auf.
- Lassen Sie sich von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten hinsichtlich des Tragens von Kontaktlinsen und der Pflege der Kontaktlinsen in dieser speziellen Situation beraten.
- Multifokale Kontaktlinsen sollten während der Anpassungsphase nur in verkehrsarmen Zeiten getragen werden. Vermeiden Sie Aktivitäten wie Autofahren. Vermeiden Sie während der Anpassungszeit insbesondere das Fahren eines Kraftfahrzeugs.
- Vermeiden Sie plötzliche Lichtwechsel während Sie multifokale Kontaktlinsen tragen. Sehschärfe führen. Wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten, wenn Sie sich mit Ihren Linsen in unterschiedlichen Lichtverhältnissen unwohl fühlen.
- Reinigen und desinfizieren Sie die Kontaktlinsen nicht. Verwenden Sie niemals die gebrauchten Kontaktlinsen erneut, da Reinigen und Desinfizieren von Linsen oder Brille für den Fall Ihrer Kontaktlinsen Sie dazu führen kann, dass Sie eine neue Linse tragen müssen.
- Tragen Sie Kontaktlinsen nicht über die empfohlene Zeit hinaus.
- Regelmäßige Nachkontrollen sind notwendig, um die dauerhafte Gesundheit Ihrer Augen sicherzustellen.
- Sprechen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten ein, falls Sie den Kontaktlinsentyp oder die Parameter ändern möchten.
- Informieren Sie Ihren Arzt darüber, dass Sie Kontaktlinsen tragen.
- Bewahren Sie die Kontaktlinsen bei Raumtemperatur auf. Lassen Sie die Kontaktlinsen nicht austrocknen.
- Teilen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht mit anderen Personen.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Sollte eines der folgenden Probleme auftreten, setzen Sie die Kontaktlinsen sofort ab und ersetzen Sie sie durch neue Kontaktlinsen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn das Problem danach weiterhin besteht. Nebenwirkungen können Infektionen, Hornhautgeschwüre, Neovaskularisation und Rötungen sein.

- Augenbrennen, Jucken, Reizung oder andere Schmerzen in den Augen
- Rötungen, reduziertes Sehschärfe, verschwommenes Sehen, Lichthöfe / -schleier, Augenschmerzen oder Lichtempfindlichkeit

Wenn beim Tragen der Kontaktlinsen schwerwiegende Ereignisse auftreten, melden Sie diese unverzüglich dem Hersteller und/oder dem Bevollmächtigten und der zuständigen Behörde.

HANDHABUNG DER KONTAKTLINSEN

- Waschen, spülen und trocknen Sie Ihre Hände stets sorgfältig, bevor Sie die Kontaktlinsen berühren.
- Tragen Sie die Kontaktlinsen nicht, wenn die sterile Verpackung geöffnet oder beschädigt wurde oder das Verfallsdatum überschritten ist.
- Gehen Sie bei der Handhabung der linken und rechten Kontaktlinse immer in derselben Reihenfolge vor (z. B. zuerst rechte Kontaktlinse).

Nur für die flache Packung:

- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die flachen Packungen über einen längeren Zeitraum aus.
- Nehmen Sie die Kontaktlinse sofort nach dem Öffnen der flachen Packung von der Schale.

Öffnen des folienversiegelten Kunststoffbehälters:

1. Halten Sie den Behälter wie in der Abbildung dargestellt und trennen Sie einen Blister ab. (Siehe Abb. 1)
2. Entfernen Sie die Blisterfolie, um die Verpackung zu öffnen. (Siehe Abb.2.)
3. Die Kontaktlinse liegt mit der Außenseite nach oben in der Schale.
4. Nehmen Sie die Kontaktlinse vorsichtig aus dem Blister und vergewissern Sie sich, dass sie frei von Beschädigungen und Fremdkörpern ist. (Siehe Abb.1.)

Öffnen der flachen Packung:

1. Ziehen Sie die Folie von der flachen Packung ab.
2. Die Kontaktlinse liegt mit der Außenseite nach oben in der flachen Packung.
3. Überprüfen Sie die Kontaktlinse auf Beschädigungen und Fremdkörper.
4. Nehmen Sie die Kontaktlinse mit der Innenseite nach oben auf die Spitze des Zeigefingers Ihrer dominanten Hand.

Aufsetzen der Kontaktlinsen:

1. Überprüfen Sie die Kontaktlinsen auf Beschädigungen und Fremdkörper.
2. Die Kontaktlinsen müssen immer in der richtigen Ausrichtung aufgesetzt werden. Überprüfen Sie die Kontaktlinsen auf Beschädigungen und Fremdkörper.
3. Nehmen Sie die Kontaktlinse mit der Innenseite nach oben auf die Spitze des Zeigefingers Ihrer dominanten Hand.
4. Halten Sie die Linse mit dem Zeigefinger Ihrer nicht dominanten Hand das Oberlid nach oben und ziehen Sie mit dem Mittelfinger Ihrer dominanten Hand das Unterlid nach unten.
5. Nähern Sie die Kontaktlinse langsam dem Auge, blicken Sie dabei geradeaus und setzen Sie die Linse vorsichtig auf.
6. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Linse.

Entfernen der Kontaktlinsen:

1. Waschen Sie sich die Hände und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Handtuch ab.
2. Halten Sie die Linse sanft zwischen Daumen und Zeigefinger Ihrer dominanten Hand fest.
3. Nehmen Sie die Linse vom Auge.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Linse.

Hersteller: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

Bevollmächtigter: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 5, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Autorisierter Repräsentant: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 5, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

CH-REP: Menicon Swiss GmbH Donnacherstrasse 27, 4500 Olten, Switzerland

Ausgabedatum 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd

Notice d'utilisation : Lentille de contact jetable à usage journalier – midafilcon A (56 d'eau)/hioxifilcon A (57 % d'eau)

Important

- **Lisez attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation et conservez le présent document dans un endroit sûr pour référence ultérieure.**
- **Suivez toujours les instructions mentionnées dans le présent document ainsi que celles de votre ophtalmologiste ou votre spécialiste de la prise en charge appropriée des lentilles de contact.**

INTRODUCTION

- Les lentilles de contact midafilcon A (56 % d'eau) sont des lentilles de contact souples en silicone hydrogel de teinte bleue avec une teneur en eau de 56 %.
- Les lentilles de contact midafilcon A (56 % d'eau) sont emballées dans un plastique individuel hermétique et immergées dans une solution saline tamponnée.
- Les lentilles de contact hioxifilcon A (57 % d'eau) sont des lentilles de contact souples en hydrogel de silicone avec une teneur en eau de 57 %.
- Les lentilles de contact hioxifilcon A (57 % d'eau) stériles sont emballées dans un plastique individuel hermétique et immergées dans une solution saline tamponnée.

INDICATIONS

- Les lentilles de contact midafilcon A (56 % d'eau) sont destinées à un port journalier unique uniquement et à la correction des amétropies réfractives (myopie, hypermétropie et/ou astigmatisme) et/ou d'une presbytie (sauf accommodation) chez les yeux aphaques sains.
- Les lentilles de contact hioxifilcon A (57 % d'eau) sont destinées à un port journalier unique uniquement et à la correction d'une amétropie de la réfraction (myopie, hypermétropie et astigmatisme) et d'une presbytie (sauf astigmatisme) pour les yeux sains non aphaques.

SIGNES ET SYMPTÔMES D'ALERTE

Retirez et jetez les lentilles de contact à la fin de chaque journée et remplacez les lyses par de nouvelles lentilles. Retirez les lentilles si le port de lentilles à usage unique augmente le risque de problèmes oculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Ne portez pas les lentilles de contact dans l'un des cas suivants.

- Inflammation ou infection aiguë ou subaiguë de la chambre antérieure des yeux
- Tout traumatisme, blessure ou anomalie affectant la cornée, la conjonctive ou les paupières
- Sécrétion lacrymale insuffisante grave (yeux secs)
- Hypoesthésie cornéenne (sensibilité cornéenne réduite)
- Toute maladie systémique susceptible d'affecter négativement par le port de lentilles de contact
- Réactions allergiques pouvant être induites ou aggravées par le port de lentilles de contact
- Infection cornéenne active
- Yeux rouges ou irrités
- Cicatrisation cornéenne incomplète après chirurgie oculaire

AVERTISSEMENTS

Tenez compte des avertissements suivants relatifs au port de lentilles de contact.

- Des problèmes oculaires peuvent se développer rapidement et entraîner une perte de la vision. Si une gêne oculaire, un développement rapide d'ulcères cornéens, une douleur, une rougeur, une irritation oculaire, un trouble visuel ou un changement de vision, En cas de gêne oculaire, de larmoiement excessif, de modifications de la vision, de rougeurs ou d'irritation des yeux ou d'autres problèmes oculaires, retirez immédiatement les lentilles et consultez votre spécialiste ou praticien.

PRÉCAUTION

- Manipulez les lentilles de contact avec précaution (faites attention à ne pas les faire tomber).
- Nettoyez puis les lentilles de contact avant vos usages.
- Mettez en place les lentilles de contact avant d'appliquer des produits cosmétiques. Retirez les lentilles de contact si vous utilisez des produits cosmétiques, lotions, crèmes ou sprays lors de la manipulation des lentilles de contact.
- Consultez votre spécialiste ou praticien avant d'utiliser un produit sur vos yeux.
- Si les lentilles de contact semblent sèches/ sur vos yeux, appliquez quelques gouttes de lentilles de contact (recommandé par votre spécialiste ou praticien spécialiste ou praticien) directement dans les yeux et attendez que les lentilles de contact soient humidifiées. Ne pas utiliser de salive ou de gouttes pour les yeux pour mouiller les lentilles de contact ou rincer les lentilles de contact, car cela peut entraîner une irritation oculaire spécialiste ou praticien. Si vous ressentez encore une gêne, consultez immédiatement votre spécialiste ou praticien de contact.
- En cas de projection de produits chimiques dans les yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau du robinet, retirez les lentilles de contact, puis consultez votre spécialiste ou praticien pour obtenir des instructions concernant le port de lentilles de contact dans cette situation spécifique. Consultez votre spécialiste ou praticien pour obtenir des instructions concernant le port de lentilles de contact dans cette situation spécifique.
- Pour les lentilles de contact multifocales, il est recommandé de de porter les lentilles pendant de courtes périodes de temps au début pour habituer vos yeux à (et en vous) pendant la période d'adaptation. Vous devez notamment éviter de conduire ou d'effectuer des tâches critiques pendant cette période.
- L'exposition à une lumière changeante lors du port de lentilles de contact multifocales peut provoquer une baisse de l'acuité visuelle. Consultez votre spécialiste ou praticien si vous ressentez une gêne lors du port de lentilles de contact dans différentes conditions d'éclairage.
- Le nettoyage de contact jetables à usage journalier ne nécessitent aucun nettoyage ou désinfection. Ne réutilisez pas les lentilles, car le nettoyage et la désinfection des lentilles de rechange ou des lunettes dépendrons au cas où vous auriez besoin de retirer les lentilles et de porter une nouvelle paire.
- Ne portez pas les lentilles de contact au-delà de la période recommandée.
- Des visites de suivi sont nécessaires pour garantir la bonne santé de vos yeux.
- Consultez votre spécialiste ou praticien si vous souhaitez changer le type de lentilles ou de paramètres.
- Informez votre spécialiste de vos yeux portez des lentilles de contact.
- Conservez les lentilles de contact à température ambiante. Ne laissez pas les lentilles se dessécher.
- Ne partagez pas les lentilles de contact avec d'autres personnes.

EFFETS INDÉSIRABLES

Si l'un des problèmes suivants survient, retirez immédiatement les lentilles de contact et remplacez-les par des lentilles neuves. Si le problème persiste, retirez les lentilles et faites-vous soigner rapidement. Des complications oculaires graves peuvent avoir lieu, telles que des infections, des ulcères cornéens et des visites.

- Démangeaison, brûlure, prurit ou toute autre douleur dans les yeux
- Corps étranger permanent ou sensation d'égratignure
- Larmoiement excessif, rougeur ou sensation d'irritation
- Sécrétion oculaire inhabituelle, rougeur, acuité visuelle réduite, vision floue, halos, photophobie ou sécheresse oculaire

En cas d'incident grave, signalez-le immédiatement au fabricant et/ou au représentant agréé et à l'autorité compétente dans votre pays.

MANIPULATION DES LENTILLES DE CONTACT

- Vous devez toujours laver, rincer et sécher soigneusement vos mains avant de manipuler les lentilles de contact.
- Ne portez pas les lentilles de contact si les emballages stériles ont été ouverts, endommagés ou si la date d'expiration est dépassée.
- Manipulez toujours les lentilles de contact droite et gauche dans la même ordre pour éviter de mélanger les lentilles.

Pour les blisters plats :

- Ne pas appliquer une force excessive pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement la lentille de contact présente sur le disque une fois le blister ouvert.

Ouverture du blister plastique hermétique :

1. Tenez la plaquette de blisters comme indiqué sur l'illustration et détachez un blister de l'unité. (Voir Fig.1.)
2. Retirez le film du blister pour l'ouvrir l'emballage. (Reportez-vous à la Fig. 2.)
3. Une lentille de contact se trouve dans le blister, face concave vers le haut.
4. Attrapez soigneusement la lentille dans le blister et examinez-la pour être sûr qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle ne comporte pas de corps étrangers. (Reportez-vous à la Fig. 2.)

Ouverture du Flat Pack :

1. Retirez le film de protection du Flat Pack.
2. La lentille de contact est placée dans le Flat Pack, face concave vers le haut.
3. Attrapez soigneusement la lentille dans le Flat Pack et examinez-la pour être sûr qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle ne comporte pas de corps étrangers.

Pose des lentilles de contact :

La procédure générale pour la pose de lentilles de contact est décrite ci-dessous. Consultez votre spécialiste ou praticien pour plus d'informations si nécessaire.

1. Placez la lentille de contact sur le bout de l'index de votre main dominante avec le côté concave vers le haut.
2. Interface le pli de la lentille pour vous assurer qu'elle n'est pas à l'envers.
3. Maintenez vos paupières écartées en tirant sur la paupière supérieure avec l'index de votre main non dominante et la paupière inférieure avec le majeur de cette même main.
4. Rapprochez lentement la lentille de votre œil tout en regardant bien droit devant vous et placez délicatement la lentille sur votre œil.
5. N'appuyez pas la lentille contre l'œil.
6. Relâchez votre œil et la lentille. Tirez sur la paupière supérieure puis la paupière inférieure pour positionner correctement la lentille.
7. Répétez cette procédure pour l'autre œil.
8. Si votre vision est floue après la pose des lentilles de contact :
   - Si les lentilles de contact ne sont pas centrées sur la cornée : Clignez des yeux plusieurs fois pour vous assurer que la lentille de contact pour le déplacer sur la cornée ou tirez sur la paupière supérieure avec l'index de votre main non dominante et la paupière inférieure avec le majeur de cette même main pour la déplacer sur la cornée.
   - Si les lentilles de contact sont centrées sur la cornée : Retirez les lentilles. Les causes possibles sont les suivantes.
     - La surface de la lentille est sale.
     - Les lentilles de contact sont à l'envers ou mauvais yeux.
     - Les lentilles ont été posées à l'envers.
9. Si votre vision est encore floue après avoir retiré les problèmes mentionnés ci-dessus, retirez les lentilles de contact et consultez votre spécialiste ou praticien. En cas de gêne importante lors du port des lentilles de contact, retirez immédiatement les lentilles de contact et consultez votre spécialiste.

Pour les lentilles de contact toriques, posez les lentilles sur la cornée en alignant correctement la marque de guidage avec le bas. (Reportez-vous à la Fig. 3 et à la Fig. 4.)

Retrait des lentilles de contact :

1. Regardez vers le haut tout en tenant votre œil bien droite.
2. Tirez la paupière inférieure vers le bas avec le majeur de votre main non dominante et placez l'index de votre main dominante sur le bout inférieur de la lentille de contact.
3. Faites glisser la lentille vers la bas sur la partie inférieure blanche de votre œil.
4. Pincez doucement la lentille entre le pouce et l'index de votre main dominante.
5. Retirez la lentille.
6. Répétez cette procédure pour l'autre œil.

Fabricant: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

Mandataire : Menicon Holdings B.V. Waanderweg 5, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Représentant autorisé: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 5, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

CH-REP: Menicon Swiss GmbH Donnacherstrasse 27, 4500 Olten, Switzerland

Date d'publication 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd

Istruzioni per l'uso: Lenti a contatto monouso giornaliere – midafilcon A (56% di acqua)/hioxifilcon A (57% di acqua)

Importante

- **Leggere con attenzione le seguenti istruzioni e conservare questo documento in un luogo sicuro per riferimenti futuri.**
- **Attenersi sempre alle istruzioni riportate in questo documento e alle indicazioni dell'oculista o dello specialista per l'utilizzo appropriato delle lenti a contatto.**

INTRODUZIONE

- midafilcon A (56% di acqua) è una lente a contatto idrogel in silicone morbido colorata di blu con contenuto d'acqua pari al 56%.
- La lente a contatto midafilcon A (56% di acqua) è avvolta singolarmente in contenitori in plastica sigillati con pellicola e immersa in soluzione salina tamponata.
- hioxifilcon A (57% di acqua) è una lente a contatto idrogel in silicone morbido di colore trasparente con contenuto d'acqua pari al 57%.
- Ogni lente a contatto hioxifilcon A (57% di acqua) sterile è confezionata singolarmente in blister sottili e immersa in soluzione salina tamponata.

INDICAZIONI

- Le lenti a contatto midafilcon A (56% di acqua) sono monouso e destinate all'uso giornaliero esclusivo e alla correzione dell'ametropia refrattiva (miopia, ipermetropia ed astigmatismo) ed presbiopia (ad eccezione dell'astigmatismo) in soggetti afachici sani e senza malattie agli occhi.
- Le lenti a contatto hioxifilcon A (57% di acqua) sono monouso e destinate all'uso giornaliero esclusivo e alla correzione dell'ametropia refrattiva (miopia, ipermetropia e astigmatismo) e presbiopia (ad eccezione dell'astigmatismo) in soggetti non afachici sani e senza malattie agli occhi.

SEGNI E SINTOMI DI AVVERTIMENTO

Rimuovere e gettare le lenti a contatto alla fine della giornata e sostituirle con lenti nuove. Rimuovere le lenti se l'uso di lenti a contatto monouso aumenta il rischio di disturbi agli occhi.

CONTROINDICAZIONI

Non indossare le lenti a contatto se si è affetti da una delle seguenti condizioni.

- Infezione o infiammazione acuta o subacuta della camera anteriore dell'occhio
- Qualsiasi trauma, lesione o anomalia che colpisca la cornea, la congiuntiva o le palpebre
- Secrezione lacrimale insufficiente grave (vasa secca)
- Ipoestesia corneale (ridotta sensibilità della cornea)
- Qualsiasi malattia sistemica che può influire negativamente per la port de lentilles de contact
- Reazioni allergiche pouvant être indutes ou aggravées par le port de lentilles de contact
- Infezione corneale active
- Occhi rossi o irritati
- Cicatrizzazione corneale incompleta après chirurgie oculaire

AVERTENZE

Tenere conto delle avvertenzesenti suivanti relativi au port de lentilles de contact.

- Des problèmes oculaires peuvent se développer rapidement et entraîner une perte de la vision. Si une gêne oculaire, un développement rapide d'ulcères cornéens, une douleur, une rougeur, une irritation oculaire, un trouble visuel ou un changement de vision, En cas de gêne oculaire, de larmoiement excessif, de modifications de la vision, de rougeurs ou d'irritation des yeux ou d'autres problèmes oculaires, retirez immédiatement les lentilles et consultez votre spécialiste ou praticien.

PRECAUZIONI

- Maneggiare le lenti a contatto con cura (fare attenzione a non farle cadere).
- Non toccare le lenti a contatto con le unghie.
- Indossare le lenti a contatto prima di applicare cosmetici. Rimuovere cosmetici, lozioni, creme o spray durante la manipolazione delle lenti a contatto.
- Consultare il proprio oculista o specialista della vista prima di utilizzare farmaci a livello oculare.
- Se la lente a contatto è secca o scomoda, applicare alcune gocce della soluzione lubrificante o umettante (consigliata dall'oculista o dallo specialista della vista). Non usare saliva o colliri per bagnare o risciacquare le lenti a contatto poiché possono causare irritazione oculare. Se il disagio persiste, rivolgersi immediatamente all'oculista o allo specialista della vista.
- In caso di spruzzi di sostanze chimiche negli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua di rubinetto, rimuovere le lenti a contatto e rivolgersi all'oculista o specialista, oppure recarsi al pronto soccorso.
- Per le lenti a contatto multifocali, si consiglia di indossare inizialmente alcuni occhiali per abituare gli occhi alle lenti a contatto. Durante questo periodo di adattamento, evitare attività come la guida e lavori che richiedono un'attenzione particolare.
- L'esposizione a luce variabile mentre si indossano lenti a contatto multifocali può provocare una perdita di acuità visuale. Consultare l'oculista o specialista della vista se si avverte disagio nell'indossare le lenti a contatto in condizioni di luce diverse.
- Le lenti a contatto monouso giornaliere non richiedono pulizia o disinfezione. Gettare sempre le lenti dopo l'uso e non riutilizzarle in nessun caso. Pulire e disinfettare le lenti o gli occhiali per l'uso non è necessario rimuovere le lenti durante la giornata.
- Non indossare le lenti oltre il periodo consigliato.
- Sono necessarie delle visite di controllo per verificare che l'occhio o mantenga sano.
- Consultare l'oculista o specialista della vista se si desidera cambiare il tipo di lenti o i parametri.
- Informare il medico curante di essere portatore di lenti a contatto.
- Conservare le lenti a contatto a temperatura ambiente. Non lasciar congelare le lenti a contatto.
- Non condividere le lenti a contatto con altre persone.

REAZIONI INDESIDERATE

Se si verifica uno dei problemi seguenti, rimuovere immediatamente le lenti a contatto e sostituirle con lenti nuove. Se il problema persiste, rimuovere le lenti e richiedere tempestivo trattamento. Possono insorgere gravi complicazioni agli occhi, come infezioni, ulcere corneali, neovascolarizzazione e cicatrici.

- Dolore, bruciore, prurito o altro tipo di fastidio all'occhio
- Lacrimazione continua o occhi rossi o sensazione di irritazione nell'occhio
- Lacrimazione eccessiva, secrezioni oculari insolite, arrossamento, riduzione definizione delle immagini, visione sfocata, aloni, fotofobia o secchezza degli occhi

In caso di incidente occorso durante l'uso delle lenti a contatto, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente.

MANIPOLAZIONE DELLE LENTI A CONTATTO

- Lavare sempre, sciacquare e asciugare accuratamente le mani prima di maneggiare le lenti a contatto.
- Non indossare le lenti se la confezione sterile è aperta o danneggiata, oppure se la data di scadenza è superata.
- Maneggiare sempre

Notkunarleiðbeiningar: Daglegar einnota augnlinsur – midaflícon A (56% vatn)/hioxifílcon A (57% vatn)

Mikilvægt
- **Lesið eftirfarandi leiðbeiningar vandlega fyrir notkun og geymið til síðari tíma.**
- **Fylgið alltaf leiðbeiningum á þessu blaði og frá augnlækni eða sjónfræðingnum/frá fyrirtækinu sem framleiðir linsurnar.**

ÞINGGANGUR
- midaflícon A (56% vatn) er hið mjúka augnlinsuefni úr silíkonhlaupi með 56% vatnsinnihaldi.
- hioxifílcon A (56% vatn) liggur í jafnvægi milli mjúkrar linsu og stífrar linsu.
- hioxifílcon A (57% vatn) er hið mjúka hlaup augnlinsuefni með 57% vatnsinnihaldi.
- Hver saxafílcon A (57% vatn) liggur í jafnvægi milli sæmilega mjúkrar linsu og stífrar linsu.

ÁBENDINGAR
- Þessar augnlinsur eru augnlinsur ætlaðar til daglegrar notkunar til að leiðrétta sjónskekkju (nærsýni og/eða fjarsýni) hjá einstaklingum sem eru með eðlilegrar sjón (að undanskildum sjónskekkju) hjá einstaklingum sem eru með eðlilegan sjónhimnubjúg.
- hioxifílcon A (57% vatn) augnlinsan er einnig til daglegrar notkunar til að leiðrétta sjónskekkju (nærsýni og/eða fjarsýni) hjá einstaklingum sem eru með eðlilegan sjónhimnubjúg og/eða einstaklingum sem eru með aspeigum og/eða augnsjúkdóma.

TAKMARKANIR Á NOTKUN
- Fjarlægið og fargið augnlinsunni við hvert daws dags og notið nýjar augnlinsur á hverjum degi sem þú setur linsur í augun. Ekki skal endurnýta augnsjúkdóm.

FRÁBENDINGAR
- Ekki nota augnlinsurnar ef um er að ræða eftirfarandi ástand.
- Bráð og meðalbráð bólga eða sýking í fremra hluti augans
- Sjúkdómar, áverkar eða frávik sem hefur áhrif á glæru, táru eða augnlok
- Alvarlega skert seyting táru (þurr augu)
- Sneiðsýkisnæmisvirkni í glæru (skert næmi í glæru)
- Ofnæmi fyrir efnum sem notuð eru í linsurnar eða augnlinsa hafi neikvæð áhrif á augun
- Ofnæmisviðbrögð sem geta verið af völdum augnlinsa og/eða augnlinsuvökva
- Virk sýking í glæru
- Virk sýking í táru
- Ofuhneigð í glæru í öðru eða báðum augum

VARNAÐARORÐ
Notendur þurfa að þekkja eftirfarandi viðvaranir sem varða notkun á augnlinsum.
- Vandamál af völdum augnlinsa, s.s. glæru, getu myndast hratt og leitt til varanlegrar sjónskerðingar. Komi fram dpagdingi í augum, mikið rauðleiki í augum eða ef augun verða viðkvæm skal hætta notkun augnlinsa tafarlaust og hafa samband við augnlækni eða sjónfræðingsinn.

VARÚÐARREGLUR
- Farið varlega með augnlinsurnar (ekki missa þær).
- Snertið linsurnar ekki með nöglunum.
- Þvoð er að leggja linsurnar í lausn en snertivöru eru notaðar. Forðist snertivörur, hlúðkrem, krem og olíu meðan linsurnar eru í augunum og notið þær ekki.
- Lesið vel og fylgið leiðbeiningum um notkun augnlinsanna áður en þær eru notuð í augun.
- Ef linsan í þurr í augunu skal setja nokkra dropa af ráðlögðu smurefni eða rakagefandi lausn (sem í augað) í samræmi við ráðleggingar frá augnlækni eða sjónfræðingi. Ekki skal nota munnvatn eða aðrar vörur til að væta linsurnar áður en þær eru settar í augun. Ekki skal nota tafarlaust leita ráða hjá augnlækninum eða sjónstækjafræðingi.
- Forðist skaðlegar áhrif af völdum útfjólublárra geisla frá sólinni með því að nota sólgleraugu sem veita góða vörn gegn útfjólubláum geislum.
- Augnlinsurnar í augu skal skola augun strax með kranavatni.
- Tafarlaust skal hafa samband við augnlækni eða sjónstækjafræðing ef augun verða rauð eða sjónstækjafræðing eða farið strax á bráðamóttöku sjúkrahúss.
- Sýndi augnlinsurnar ekki tilætluð áhrif skal hafa samband við augnlækni eða sjónfræðingsinn. Í versta falli skal hætta notkun augnlinsanna.
- Meðan á notkun augnlinsa stendur skal forðast að nota snyrtivörur.
- Meðan á notkun augnlinsa stendur skal forðast að nota snyrtivörur.
- Skynsamlegt þykir að meðhöndlar augnlinsur ekki nema hafa vandlega þvegið og þurrkað hendurnar. Hárlausar, ilmefnalausar og ekki feitar sápur eru best til þess fallnar. Hendurnar skal þurrka með hreinu handklæði sem ekki gefur frá sér trefjar.
- Ekki má nota linsurnar ef þær hafa skemmst.
- Naudsynlegt er að fara í eftirlit reglulega til að tryggja heilbrigði augnanna.
- Ekki skal nota augnlinsurnar ef umbúðir eða sótthreinsivökvinn er skipt er um linsutegund eða annar breytingar eiga sér stað.
- Lélta lækninum þínum eða sjónfræðingnum ef þú ert óánægð/ur.
- Geymið augnlinsur við stofuhita. Ekki leyfa linsunum að frjósa.
- Ekki er mælt með endurnotkun.

ALLAVARÚÐARORÐ
- Ekki skal nota augnlinsur vandamála kemur fram skaðu farlegar augnlinsumar skaðast, litist eða mislitast. Notkun sótthreinsivökvi, skaðu farlegra linsumar og leita tafarlausri meðferðar. Alvarlegur augnskaði getur orsakast af bakteríum, svo sem sýkingu, sár á glæru, myglusmitunum eða blæmusóttar.
- Ekki skal eða klóra í augum, eða annar augnverkur
- Stöðug tilfinning um að aðskotahlutur sé í eða nýjar sár á augum
- Mikil tárarumlun, óeðlileg augnseyting, roði, minnkuð sjónskerpa, ljósfælni, þokusýn eða bólgnað augnlok
- Augnlinsurnar skal fjarlægja strax ef einhverjum skal sýkingu sitt til viðvörunnu tilvikum skal hafa samband við augnlækni.

MEÐHÖNDLUN AUGNLINSA
- Áður skal þvo, skola og þurrka hendur vandlega áður en linsurnar eru snertar.
- Ekki skal nota augnlinsur af saeltar umbúðum hafa verið opnaðar eða þær skemmst eða saeltar af einhverjum ástæðum.
- Meðhöndlau alltaf vinsti og hægri linsurnar í röinu til að forðast að rúlla þeim saman.
- Athons fyrir tæður umbúðir:
- Ekki nota ef mikinn kraft á flata pakkann.
- Ekki nota ef umbúðir eru skemmdar eða ef innsiglið er rofið.
- Tæki linsurnar varlega úr og skolaðu þær á milli hvað augnlæknir eða sjónfræðingur hefur mælt með.
- Ekki nota ef linsan er skemmd eða sködduð.

Instruções de utilização: Lentes de contacto diárias descartáveis – midaflícon A (56% de água)/hioxifílcon A (57% de água)

Importante
- **Leia cuidadosamente as instruções seguintes antes de utilizar as lentes e guarde este documento num local seguro para consulta futura.**
- **Siga sempre as instruções deste documento bem como as do seu especialista de cuidados oculares ou oftalmologista para saber como usar corretamente as lentes de contacto.**

INTRODUÇÃO
- A midaflícon A (56% de água) é uma lente de contacto de hidrogel de silicone suave de cor azul com um teor de água de 56%.
- A midaflícon A (56% de água) estabiliza-se em torno de uma combinação de plástico rígido e de uma lente de contacto hidrogel suave.
- A hioxifílcon A (57% de água) é uma lente de contacto de hidrogel de cor azul com um teor de água de 57%.
- A saxafílcon A (57% de água) estabiliza-se entre as duas combinações de plástico individual estável e esta lente mole solução salina temporária.

INDICAÇÕES
- As lentes de contacto midaflícon A (56% de água) e hioxifílcon A (57% de água) destinam-se à correção da ametropia refrativa (miopia, hipermetropia e/ou astigmatismo) e/ou presbiopia (exceto astigmatismo) em olhos não afetados por doença ocular.
- A hioxifílcon A (57% de água) é indicada para uso único diário e para correção da ametropia refrativa (miopia, hipermetropia e/ou astigmatismo) e/ou presbiopia em pessoas com aspeigum e/ou afeções oculares sem qualquer doença ocular.

RESTRIÇÕES DE USO:
- Retire e deite fora as lentes de contacto no fim de cada dia e use novas lentes de cada vez.
- Remova a lente de contacto e deite fora de cada vez.

CONTRA-INDICAÇÕES
- Não utilize as lentes de contacto nas situações indicadas a seguir:
- Inflamação aguda e aguda na zona do segmento anterior do olho.
- Qualquer doença, lesão ou anomalia que afete a córnea, a conjuntiva ou as pálpebras.
- Insuficiência acentuada da lágrima.
- Hipossensa corneana (redução da sensibilidade corneana).
- Qualquer doença sistémica que possa afetar ou ser afetada pela utilização das lentes de contacto.
- Qualquer afeção que possam ser provocadas ou exacerbadas pelo uso de lentes de contacto.
- Qualquer infeção corneana activa.
- Olhos vermelhos ou irritados.
- Coloração corneana inexplicada após corgua ocular
- Alergia

Caso tenha os seguintes sintomas, retire as suas lentes de contacto e:
- Os problemas oculares produzidos pelo uso de lentes de contacto, como úlceras corneanas, podem desenvolver-se rapidamente e podem levar à perda de visão. Em caso de descontrolo ocular, lacrimejar excessivo, alterações da visão, vermelhidão ou outros problemas oculares, consulte imediatamente o seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista.

PRECAUÇÕES
- Manuseie e use as lentes de contacto com cuidado (não as deixe cair).
- Não toque nas lentes de contacto com as unhas.
- Coloque as lentes de contacto antes de usar cosméticos. Não aplique cosméticos, incites, cremes ou spraya ao manusear as lentes de contacto.
- Leia atentamente as instruções de utilização e de manutenção antes de aplicar qualquer remédio nos olhos.
- Se as lentes de contacto perecerem secas ao contacto com os olhos, aplique algumas gotas de solução de lubrificação, se for recomendado pelo seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista) diretamente nos olhos e deixe que as lentes de contacto humedeçam antes de as colocar nos olhos. Se as lentes de contacto se colarem, consulte imediatamente o seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista.
- Em caso de ocorrer qualquer alteração ou a sua prescrição for alterada, deite fora as suas lentes de contacto.
- Não use lentes de contacto se estiver sujeito a exposição a gases, vapores ou fumos prejudiciais ou que provoquem irritação quando está a usar lentes de contacto.
- Não use lentes de contacto se estiver sujeito a exposição a gases, vapores ou fumos prejudiciais ou que provoquem irritação quando está a usar lentes de contacto.
- Não use lentes de contacto se estiver sujeito a exposição a gases, vapores ou fumos prejudiciais ou que provoquem irritação quando está a usar lentes de contacto.
- Consulte o seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista se sofrer de qualquer problema ou tiver dúvidas.
- Informe o seu médico de família de que tais fotossensíveis lentes de contacto.
- Consulte o seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista se quiser colocar lentes de contacto para exercer atividades desportivas.

REACÇÕES ADVERSAS
- Retire as lentes de contacto se os seguintes problemas, retire imediatamente as lentes de contacto e substitua-as por lentes novas. Se o problema continuar, retire as lentes e consulte imediatamente o seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista:
- como infeções, úlcera corneana, neovascularização e irite.
- Se as lentes de contacto ficarem presas e não se moverem livremente para cima ou para baixo no olho ou se não se centrarem sobre a pupila do olho quando olha em frente.
- Lacrimejar excessivo, secreções aquosas ou oleosas, olho vermelhido, acuidade visual reduzida, visão distorcida, halos, fotofobia ou dor ocular.
- Se ocorrerem incidentes graves nas lentes de contacto, comunique-os ao seu mandatário e ao seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista.

MANUSEAR AS LENTES DE CONTACTO
- Lave, enxagúe e seque sempre as mãos cuidadosamente antes de manusear as lentes de contacto.
- Lave as lentes de contacto se as embalagens estiverem levemente sobs abertas ou se estiverem danificadas, e se a data de calculadas for ultrapassada.
- Manuseie sempre as lentes de contacto esquerda e direita pela mesma ordem, para a evitar torcer as lentes por engano.
- Apenas para a embalagem plana:
- Puxe a tira para abrir a embalagem plana durante um longo período da tampa.
- Pegue e lente de contacto pelo disco mediamente depois de abrir a embalagem plana.

Abrir a embalagem de plástico selada:
1. Segure a tira de plástico direita com uma mão na tudoação, e retire uma embalagem. (Consulte a Fig. 1.)
2. Retire a película protetora de papel e abra-a totalmente. (Consulte a Fig. 2.)
3. Localize uma lente de contacto com o lado convexo virado para cima na embalagem. Retire com cuidado a lente de contacto com o dedo indicador da sua mão não-dominante e coloque o indicador da sua mão dominante na extremidade inferior da lente. (Consulte a Fig. 3.)
4. Lavrimejar excessivo, secreções aquosas ou oleosas, olho vermelhido, acuidade visual reduzida, visão distorcida, halos, fotofobia ou dor ocular.
5. Se ocorrerem incidentes graves nas lentes de contacto, comunique-os ao seu mandatário e ao seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista.

Colocar as lentes de contacto:
O procedimento geral para colocar as lentes de contacto é descrito abaixo. Se necessário, peça ao seu especialista em lentes de contacto ou oftalmologista para obter mais detalhes.
1. Coloque a lente de contacto na ponta do indicador da sua mão dominante com o lado côncavo virado para cima.
2. Verifique o contorno da lente para se certificar de que não está rasgada ou contorcida.
3. Segure a pálpebra superior do olho esquerdo com a mão direita e puxe a pálpebra inferior com o indicador da sua mão não-dominante, e a pálpebra inferior com o dedo médio da sua mão dominante.
4. Segure cuidadosamente a lente no dedo enquanto olha em frente e, a colocar suavemente a lente na córnea.
5. Solte a pálpebra inferior e, em seguida, a pálpebra superior, depois a pálpebra inferior e pisque lentamente a mesma pressão.
6. Lentamente fazer movimentos circulares com a lente para a centralizar.
7. Repita o mesmo procedimento com o outro olho.

Fabricante: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0008 Japan
www.menicon.com

Mandatário: Menicon Holdings B.V. Waandereg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands
Data de emissão 2023-09
©2023, Menicon Co., Ltd.

Инструкции за употреба: Едноневни контактни лещи – midaflícon A (56% вода)/hioxifílcon A (57% вода)

Важно
- **Прочетете внимателно приложените инструкции и запазете документа за бъдещи справки.**
- **Винаги спазвайте инструкциите в този документ и указанията на своя специалист по грижа за очите или офталмолога за това как правилно да използвате контактните лещи.**

ВЪВЕДЕНИЕ
- midaflícon A (56% вода) са мека контактни лещи от силиконов хидрогел, син цвят, с водно съдържание 56%.
- Контактните лещи от типа midaflícon A (56% вода) се отличават с оптимална комбинация от твърда пластмаса и мека временна физиологична разтворна лещи.
- hioxifílcon A (57% вода) са мека контактни лещи от хидрогел, със син цвят, с водно съдържание 57%.
- Контактните лещи от типа hioxifílcon A (57 % вода) се отличават с оптимална комбинация от твърда пластмаса и мека временна физиологична разтворна лещи.

ПОКАЗАНИЯ
- Контактните лещи midaflícon A (56% вода) са предназначени за корекция на аметропия (миопия, хиперметропия и/или астигматизъм) и/или пресбиопия (освен при очни лезии, причинени от заболяване).
- hioxifílcon A (57% вода) е предназначена за употреба само веднъж и за корекция на аметропия (миопия, хиперметропия и/или астигматизъм) и/или пресбиопия при пациенти с аспеигум и/или очни заболявания, без да е налице очно заболяване.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Спазвайте изискванията относно смяната на лещи и дезинфекцията на очите.
Сменяйте и изхвърляйте контактните лещи в съответствие с препоръките на производителя.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не използвайте контактните лещи при наличие от следните състояния.
- Остро или субостро възпаление или инфекция на предната камера на окото
- Сериозно намаляване на сълзната секреция (синдром на сухото око)
- Сериозно намаляване на роговичната чувствителност
- Роговична дегенерация, неоваскуларизация на очната повърхност, язви, причинени от инфекция
- Всяка инфекция, възпаление или алергия, засягащи очите или околните тъкани
- Всяко състояние, което може да повлияе отрицателно на контактните лещи, използвани за очна или системна терапия
- Всяко заболяване, което може да повлияе или да бъде повлияно от използването на контактни лещи
- Всяка алергия към компонентите на разтворите, използвани за почистване или дезинфекция на контактните лещи
- Всяка очна инфекция
- Зачервени или раздразнени очи
- Необяснимо оцветяване на роговицата след очна операция
- Алергия

Ако имате някой от следните симптоми, незабавно извадете контактните лещи и:
- Проблемите с очите, причинени от използването на контактни лещи, например роговични язви, могат да се развият бързо и да доведат до загуба на зрение. При възникване на проблеми с очите, като обилно сълзене, зачервяване, промяна в зрението, замъгляване на очите или други проблеми, незабавно свържете се с вашия специалист по грижа за очите или офталмолог (лекар, който специализира в областта на очните заболявания).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
- Работете внимателно с контактните лещи (не ги изпускайте).
- Не докосвайте контактните лещи с нокти.
- Поставяйте контактните лещи преди използване на козметични продукти. Не използвайте козметични продукти, докато носите контактни лещи.
- Ако контактните лещи станат сухи, поставете в очите подходящата течност, не използвайте слюнка или други продукти. Ако сухотата продължава, незабавно се консултирайте със своя специалист.
- Ако сте изложени на прекомерна слънчева светлина, носете подходящи слънчеви очила, които предлагат добра защита срещу ултравиолетовите лъчи.
- В случай на чуждестранни частици в очите незабавно промийте очите с чиста вода.
- Консултирайте се незабавно с вашия специалист по грижа за очите или офталмолог, ако очите ви станат червени или ако имате проблеми, свързани с контактните лещи.
- Ако контактните лещи не работят по предвиден начин, консултирайте се със специалист. Ако е необходимо, спрете да използвате контактните лещи.
- Ако контактните лещи причиняват дискомфорт при носене на контактни лещи, свържете се с вашия специалист по грижа за очите или офталмолог.
- Ако имате някакви въпроси относно употребата на контактните лещи, се свържете с вашия специалист по грижа за очите или офталмолог.
- Не носете контактните лещи, ако сте изложени на химикали, пари или дим, които могат да причинят дразнене, докато носите контактни лещи.
- Не използвайте